SCORVET® FORTE
Solutio pro canibus

СКОРВЕТ® ФОРТЕ ЗА КУЧЕТА
Разтвор за прилагане върху ограничен участък при кучета.

СЪСТАВ
Fipronil 67,0 mg, 134,0 mg, 268,0 mg и 402,0 mg;
S-methoprene 60,3 mg, 120,6 mg, 241,2 mg и 361,8 mg.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
Фармакологичното действие на фипронила е свързано с блокиране на ГАМК-зависимите (гама-амино-маслена киселина) рецептори на паразитите, което нарушава предаването на нервните импулси и води до парализа и смърт на ектопаразитите. Фипронилът убива бълхите в рамките на 24 часа, а кърлежите и въшките в рамките на 48 часа след прилагането.
S-метопренът инхибира ювенилния хормон, способстващ за образуване на хитина и нарушава развитието на бълхите в стадиите яйца и личинки. Овоцидната активност е в резултат от директната пенетрация на s-метопрена през яйчната обвивка или от абсорбцията му през кутикулата на възрастните бълхи. S-метопрена предотвратява развитието на ларвите и какавидите на бълхите, което предпазва околната среда и третираните животни от заразяване с незрелите им форми.
При нанасяне върху кожата продуктът не се резорбира, а постепенно, в рамките на 24 часа се разпределя по повърхността на тялото, като се натрупва в мастните жлези и оказва продължително инсектоакарицидно действие.
S-метопрен и фипронил, заедно с неговия основен метаболит, са добре разпределени в козината на кучето до един ден след приложение. Концентрациите им намаляват с времето и се откриват най-малко 60 дни след прилагане. Паразитите умират главно при контакт, а не при системна експозиция.Не е забелязано фармакологично взаимодействие между фипронил и s-метопрен.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Продуктът се прилага при опаразитяване с кърлежи, бълхи или въшки:
- Кърлежи (*Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis*). Продуктът има активност срещу кърлежи в продължение на 4 седмици след приложение;
- Бълхи (*Ctenocephalides felis spp.*) - яйца, ларви, какавиди и възрастни форми. Инсектицидната ефикасност срещу повторно опаразитяване с възрастни бълхи продължава до 8 седмици. Продуктът може да се използва като част от терапията и като средство за контрол върху алергичния дерматит, причинен от бълхи;
- Въшки (*Trichodectes canis*).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при кученца под 2 месечна възраст и на такива с телесна маса под 2 kg.
Да не се използва при болни (системни заболявания, треска) или възстановяващи се от заболяване животни.
Да не се използва при зайци, поради опасност от неблагоприятни реакции.
Да не се използва при котки, поради опасност от предозиране.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Няма.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта
Животните не трябва да се ближат по между си след третиране с продукта.

Животните не трябва да се къпят или плуват за период от 2 дни след прилагане на продукта. Не се препоръчва къпане на животните по-често от веднъж седмично.
При масово опаразитяване на клетките, леглата и местата за почивка на животните с бълхи, трябва да се третира с подходящ инсектициден продукт.Да не се галят и да не се позволява на деца да играят с третираните животни, до пълното изсъхване на мястото на приложение на продукта. Препоръчва се животните да се третират вечер и не се разрешава да спят със стопаните си и особено с деца.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните
Продуктът може да причини раздразнение на кожата и очите. Да се избягва контакт на продукта с устата, кожата и очите. Животни или хора с установена свръхчувствителност към фипронил, S-метопрен или алкохол трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. Да се избягва възможен контакт на пръстите на ръката със съдържанието на опаковката. При възникването на случаен контакт, ръцете да се измият със сапун и вода. При случаен контакт с очите да се напръскат обилно с вода. Да се измият ръцете след употреба.Да не се галят и да не се позволява на деца да играят с третираните животни до пълното изсъхване на мястото на приложение на продукта. Да не се пуши, пие и яде по време на приложението на продукта.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ (ЧЕСТОТА И ВАЖНОСТ)
В редки случаи може да се наблюдава преходна кожна реакция на мястото на приложение (промяна в цвета на кожата, локална алопеция, сърбеж, зачервяване), както и генерализиран сърбеж или алопеция. При облизване на козината след третиране с продукта е възможно да се наблюдава краткотрайно повишено слюноотделяне. В редки случаи е възможна появата на хиперсаливация, обратими неврологични симптоми (хиперестезия, депресия, нервни симптоми), повръщане или респираторни симптоми.

УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ, ЛАКТАЦИЯ ИЛИ ЯЙЦЕНОСЕНЕ
Може да се прилага по време на бременност и лактация.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Не са известни.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Локално, върху кожата в област, която животното не може да ближе и в следната последователност:
1. Извадете пипетата от опаковката. Дръжте пипетата изправена. Отчупете върха на пипетата след почукване на върха й, за да осигурите връщането на продукта в разширената част на пипетата.
2. Разгърнете козината на гърба на животното в основата на врата, докато се види кожата. Допрете върха на пипетата до кожата. Изстискайте пипетата няколко пъти, до попадане на цялото съдържание върху кожата.

Дозировка

Телесна маса, kg	Обем на пипетата, ml	Честота на прилагане
2-10	0.67	ежемесечно
11-20	1.34	ежемесечно
21-40	2.68	ежемесечно
41-60	4.02	ежемесечно

ПРЕДОЗИРАНЕ (СИМПТОМИ, СПЕШНИ МЕРКИ, АНТИДОТИ), АКО Е НЕОБХОДИМО
Рискът от неблагоприятни реакции се увеличава при предозиране на продукта, поради което животните винаги трябва да се третират с пипета от правилния обем, съответстващ на телесната маса.

КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.

НЕСЪВМЕСТИМОСТИ
Не са известни.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

ВИД И СЪСТАВ НА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Пипетите от ПЕТ фолио по 0.67 ml, 1.34 ml, 2.68 ml или 4.02 ml.

Съдържание