ЛИСТОВКА:

CASTOREX RHDV2 инжекционна суспензия за зайци

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ
CASTOREX RHDV2 инжекционна суспензия за зайци

2. СЪСТАВ
Една доза от ваксината 0,5 ml съдържа:
Активни вещества:
Rabbit haemorrhagic disease virus, тип 2, щам F/12B, инактивиран ≥ 0.300 O.D.*

* ELISA оптична плътност в заешки серуми след ваксинация

Аджуванти:
Aluminium hydroxide gel ≤ 1.5 mg

Помощни вещества:

Качествен състав на помощните средства и другите съставки	Количествен състав, ако информацията е важна с оглед на правилното прилагане на ветеринарния лекарствен продукт
Formaldehyde	≤ 0.25 mg
Thiomersal	≤ 0.06 mg

Суспензия с червено-кафяв цвят и лесно разклащащ се седимент от инактивиран RHDV2, адсорбиран върху алуминиев хидроксидин гел, който представлява 40–60% от ваксината при оставяне в покой.

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП
Зайци.



4. ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
За активна имунизация на зайци за предотвратяване на смъртност, причинена от вируса на RHD тип 2.
Начало на имунитета: 7 дни.
Продължителност на имунитета: 1 година.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.

6. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Специални предупреждения:
Да се ваксинират само здрави животни.
Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:
Не е приложимо.
Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:
При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.
Бременност:
Може да се прилага по време на бременност.
Не се препоръчва прилагането през последната третина на бременността, за да се избегне стрес от манипулации и риск от аборт. Бременните зайкини трябва да се третират с особено внимание.
Лактация:
Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана по време на лактация.
Заплодяемост:
Влиянието на ваксинацията върху заплодяемостта на зайците не е проучено.
Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:
Наличните данни за безопасност и ефикасност сочат, че тази ваксина може да бъде прилагана в същия ден, но без да бъде смесвана с инактивираната ваксина срещу RHDV тип 1 (Castorex). Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарни лекарствени продукти. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарен лекарствен продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.
Предозиране:
След прилагане на двукратно по-висока доза не се наблюдават нежелани реакции, с изключение на посочените в раздела "Неблагоприятни реакции".
Основни несъвместимости:
При липса на данни за съвместимост този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

7. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Зайци

Нечести (1 до 10 на 1000 третирани животни):	Подуване на мястото на инжектиране*

[1]Лек оток, до 0,5 см в диаметър на мястото на инжектиране, който изчезва в рамките на 7 дни, в някои случаи първоначално може да бъде придружен от повишена ректална температура (до 0,9 °C)

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на ветеринарния лекарствен продукт. Съобщенията трябва да се изпращат, за предпочитане чрез ветеринарен лекар, или на притежателя на разрешението за търговия или на местния му представител, или на националния компетентен орган чрез националната система за съобщаване. За съответните данни за връзка вижте листовката.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, НАЧИНИ И МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Подкожно приложение.
Една доза: 0,5 ml

Първична ваксинация:
Една инжекция при зайци на възраст от 6 седмици.
В зависимост от епизоотологичната обстановка е възможно ваксиниране на зайци от 4-седмична възраст, последвано от бустерна ваксинация 4 седмици след първата инжекция.

Ревакцинация:
Една инжекция на всеки 12 месеца.

9. СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА
Разклатете добре преди и от време на време по време на прилагане.
Преди приложение оставете ваксината да се затопли до стайна температура.
Прилагайте при обичайни асептични условия, като използвате само стерилни спринцовки и игли.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ
Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).
Да се пази от замръзване.
Да се пази от светлина.
Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.
Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 10 часа.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ
Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.
Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Да се отпуска по лекарско предписание.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗМЕРИ ОПАКОВКИ
0022-3368

Флакон от неутрално боросиликатно стъкло с висока хидролитична устойчивост (тип 1), затворен с гумена запушалка, подходяща за парентерални препарати, и алуминиева капачка.

Размер на опаковката:
Картонена кутия, съдържаща 1 флакон с 10 дози
Картонена кутия, съдържаща 1 флакон с 20 дози
Картонена кутия, съдържаща 1 флакон с 40 дози
Картонена кутия, съдържаща 10 флакона с 1 доза

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
02/2026

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. ДАННИ ЗА ВРЪЗКА
Притежател на разрешението за търговия и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:
ВЕТ ПРО КОМЕРС ООД
4023 Пловдив, България
ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Тел: +359 897 84 39 18
Email: info@vepco.bg

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:
PHARMAGAL BIO, s. r. o.
Murgašova 5
949 01 Nitra
Slovak Republic
tel: +421 37 65 33 171
Email: bio@pharmagalbio.sk

За всякаква информация относно този ветеринарен лекарствен продукт, моля, свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за търговия.

VEPCO