**ЛИСТОВКА:**

# CATFORCE 20 mg/230 mg таблетки за котки

**1.Наименование на ветеринарния лекарствен продукт**
CATFORCE 20 mg/230 mg таблетки за котки

**2. Състав**
Всяка 350 mg таблетка съдържа:
**Активни вещества:**
Praziquantel 20 mg
Pyrantel pamoate 230 mg

**Помощни вещества:**

| Качествен състав на помощните вещества и другите съставки |
|---|
| Lactose monohydrate |
| Microcrystalline cellulose |
| Croscarmellose sodium |
| Sodium lauryl sulfate |
| Povidone (PVPK-30) |
| Purified water |
| Colloidal anhydrous silica |
| Magnesium stearate |
| Artificial powdered flavour |

Овална таблетка без покритие, с цвят от почти бял до жълтеникаво-кафяв, с делителна черта от двете страни. Едната страна е дълбоко вдлъбната.

**3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП**



Котки.

**4. Показания за употреба**
За лечение и контрол на инфекции, причинени от кръгли червеи, анкилостоми и тении.
Контролирани паразити:
Кръгли червеи:
*Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*
Анкилостоми:
*Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma brazilense, Uncinaria stenocephala*
Тении:
*Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis*

**5. Противопоказания**
Да не се използва едновременно с продукти, съдържащи пиперазинови съединения.
Да не се използва при котенца на възраст под 6 седмици.

**6. Специални предупреждения**
Специални предупреждения:
Бълхите служат като междинни гостоприемници за един често срещан вид тения – *Dipylidium caninum*. Инфекцията с тении ще се повтори, ако не се предприеме контрол върху междинните гостоприемници, като бълхи, мишки и други.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Лицата, които прилагат таблетките директно на котката или ги добавят към храната ѝ, трябва да измиват ръцете си след това.

Бременност и лактация:
Не се прилага по време на бременност.
Може да се прилага по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:
Да не се използва едновременно с продукти, съдържащи пиперазинови съединения.

Предозиране:
При котки, на които е приложена доза до 10 пъти над препоръчаната терапевтична, се наблюдават повръщане и повишено слюноотделяне. При някои животни са наблюдавани преходна загуба на апетит и меки изпражнения. Други клинично значими неблагоприятни реакции не са установени.

**7. Неблагоприятни реакции**
Котки:

| | |
|---|---|
| Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения): | Гастроинтестинални признаци: като повръщане, хиперсаливация[1]<br>Неврологични признаци: като атаксия[2] |

[1] В повечето случаи тези признаци са леки и преходни.
[2] В повечето случаи тези признаци са преходни.
Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване.

**8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение**
Перорално приложение.
Препоръчителната доза е 57.5 mg/kg пирантел памоат и 5 mg/kg празиквантел. Таблетките се дават директно в устата, но при необходимост могат да се приложат с малко количество храна.

| Телесна маса | Таблетки |
|---|---|
| 1.0 - 2.0 кг | 1/2 таблетка |
| 2.1 - 4.0 кг | 1 таблетка |
| 4.1 - 6.0 кг | 1 1/2 таблетка |
| 6.1 - 8.0 кг | 2 таблетки |

**9. Съвети за правилното прилагане на продукта**
Препоръчителен режим на лечение:
Котенца: третиране на 6, 8, 10 и 12 седмици, след което веднъж месечно до 6-месечна възраст; след това на всеки 3 месеца.
Кърмещи котки: трябва да се третират едновременно с котенцата.
Възрастни котки: третиране на всеки 3 месеца.

**10. Карентни срокове**
Не е приложимо.

**11.Специални условия за съхранение**
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура под 30 °C.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.
**12. Специални предпазни мерки при унищожаване**
Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.
Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

**13.Класификация на ветеринарните лекарствени продукти**
Да се отпуска само по лекарско предписание.

**14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки**
Alu-PVC или PVC/PE/PVDC - блистер, съдържащ 10 таблетки.

Кутия с 1 блистер, съдържаща 10 таблетки.
Кутия с 5 блистера, съдържаща 50 таблетки.
Кутия с 10 блистера, съдържаща 100 таблетки.
Кутия с 20 блистера, съдържаща 200 таблетки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

**15. Дата на последната редакция на текста**

06/2026

**16. Данни за връзка**
Притежател на разрешението за търговия, производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

ВЕТ ПРО КОМЕРС ООД
4023 Пловдив, Р. България
ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Тел: +359 897 84 39 18
Email: info@vepco.bg

VEPCO