ЛИСТОВКА:

KIPUFEN 10 % Перорална паста за кучета, котки, кученца и котенца

1.Наименование на ветеринарния лекарствен продукт
KIPUFEN 10 % Перорална паста за кучета, котки, кученца и котенца

2. Състав
Всеки ml съдържа:
Активно вещество:
Fenbendazole 100 mg
Бяла до почти бяла еднородна паста.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП
Кучета, котки, кученца и котенца.

4. Показания за употреба
Лечение на кучета и котки, заразени с незрели и зрели стадии на нематоди в гастроинтестиналния и дихателния тракт. Продуктът има и овициден ефект върху яйцата на нематодите.
Кучета и котки:
За лечение на възрастни кучета и котки инвазирани с гастроинтестинални паразити:
Ascarid spp. *(Toxocara canis, Toxocara cati* and *Toxascaris leonina)*
Ancylostoma spp.
Trichuris spp.
Uncinaria spp.
Taenia spp.
Кученца и котенца:
За лечение на отбити кученца и котенца, заразени с гастроинтестинални нематоди и кученца, заразени с протозои (*Giardia* spp.).
Бременни кучета:
За лечение на бременни кучета за намаляване на пренаталните инфекции с *Toxocara canis* и предаването на *T. canis* и *Ancylostoma caninum* на малките им чрез млякото.
Също така за лечение на кучета, заразени с белодробни нематоди *Oslerus (Filaroides) osleri* или протозоа *Giardia* spp. и котки заразени с белодробни нематоди *Aelurostrongylus abstrusus.*

5. Противопоказания
Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

6. Специални предупреждения
Специални предупреждения:
Трябва да се внимава да се избягват следните практики, тъй като те увеличават риска от развитие на резистентност и биха могли да доведат до неефективна терапия:
- Твърде честа и многократна употреба на антихелминтици от един и същи клас за продължителен период от време.
- Прилагане на по-ниска от препоръчаната доза, което може да се дължи на неточно определяне на телесната маса, неправилно приложение на продукта или некалибрирано дозиращото устройство.

Съмнителните клинични случаи на резистентност към антихелминтици трябва да бъдат допълнително проучени с помощта на подходящи тестове (напр. тест за редукция на броя на яйцата във фекалните проби). Когато резултатите от теста(овете) категорично показват резистентност към определен антихелминтик, трябва да се използва антихелминтик, принадлежащ към друг фармакологичен клас и с различен механизъм на действие.
Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:
За да се осигури прилагането на правилната доза, телесната маса на животните трябва да се определи възможно най-точно.
Паразитна резистентност към конкретен клас антихелминтици може да се развие след честа и многократна употреба на антихелминтици от този клас.
Както и при други антихелминтици, трябва да се потърси съвет от ветеринарен лекар относно подходящи програми за дозиране и управление на животните, за да се постигне адекватен контрол на паразитите и да се намали вероятността от развитие на резистентност към антихелминтици.
Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:
Избягвайте директен контакт с кожата, доколкото е възможно.
Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.
Измийте ръцете си внимателно след прилагане на продукта.
Бременност и лактация:
Може да се прилага по време на бременност и лактация.

7. Неблагоприятни реакции
Не са известни.
Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение
Перорално приложение.
Препоръчителната доза е 50 mg фенбендазол/kg телесна маса в продължение на 3 последователни дни или еднократна доза от 100 mg фенбедазол/kg телесна маса (за възрастни), или 10 ml KIPUFEN 10 % Oral Paste е достатъчна за третиране до 10 kg телесна маса като еднократна доза.
За лечение на клинични паразитни инфестации при възрастни кучета и котки или инфекции с *Giardia* spp. при кучета и кученца, приложете 50 mg фенбендазол/kg телесна маса дневно в продължение на 3 дни.
За контрол на белодробни нематоди *Oslerus* (*Filaroides*) osleri при кучета приложете 50 mg фенбендазол/kg телесна маса дневно за 7 дни. В някои случаи може да се наложи повторен курс на лечение.
За контрол на белодробни нематоди *Aelurostrongylus abstrusus* при котки приложете 50 mg фенбендазол/kg телесна маса дневно за 3 дни.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта
Пастата се прилага перорално чрез вкарване на накрайника на спринцовката през междузъбното пространство и въвеждане на необходимото количество паста върху задната част на езика. Устата на животното трябва да е свободна от храна. Веднага след приложение, повдигнете главата на домашния любимец за няколко секунди, за да се уверите, че дозата е погълната.

10. Карентни срокове
Не е приложимо.

11. Специални условия за съхранение
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура под 30 °C.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване
Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.
Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти
Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки
0022-3383
Пластмасова спринцовка от 15 ml с кръгла капачка, опакована в картонена кутия.
Пластмасова спринцовка от 30 ml с кръгла капачка, опакована в картонена кутия.

15. Дата на последната редакция на текста
06/2026

16. Данни за връзка
Притежател на разрешението за търговия, производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

ВЕТ ПРО КОМЕРС ООД
4023 Пловдив, България
ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2
Тел: +359 897 84 39 18
Email: info@vepco.bg

VEPCO